

PATHOLOGIES INFECTIEUSES

Panaris

Panaris

C'est une infection aiguë et superficielle des **parties molles** (=abcès). Elle touche le plus souvent la zone péri-unguéale par **inoculation septique** non retrouvée de staphylocoque doré (60%).

Interrogatoire

- Rechercher le début des signes
- **Type de douleur** (pour savoir si phase inflammatoire ou collectée)
- Terrain favorisant l'infection : **diabète, immunodépression, corticoïde**

Porte d'entrée

- Inoculation septique
- Onychophagie ? Plaie à proximité ?
- Vaccination tétanos ?



Bien différencier

la phase inflammatoire de la phase collectée

Tableau clinique (phase inflammatoire)

- Rougeur
- Douleur à la palpation (PAS spontané)
- **PAS** de fièvre
- **PAS** d'adénopathie ni de lymphangite

*inoculation
directe*



Tableau clinique (phase collectée)

- Collection **purulente** (pas forcément visible)
- Douleur **pulsatile spontanée**
- Douleur **insomniente**
- **PAS** de fièvre
- Adénopathies axillaires possibles

Examens complémentaires

- Radio + à la recherche de :
- Complications (ostéite),
- Corps étranger
- Autre diagnostique

Complications

- Phlegmon des fléchisseurs si face palmaire
- Arthrite septique si en regard d'une articulation
- Ostéite (+rare)

Traitement

- **CHIRURGICAL UNIQUEMENT !** (Excision de toute la zone collectée)
- ATB si patient immunodéprimé
- Pansements si pris en charge en phase inflammatoire

